

FICHA TÉCNICA

"USO AGRÍCOLA"



COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Bifentrina: 2-metil-3-fenilbencil (1RS)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato (Equivalente a 100 g de i.a./L a 20°C).	10.80
INGREDIENTES INERTES:	
Emulsificantes y solvente	89.20
Total	100.00

No. de Registro: RSCO-INAC-0176-X0210-009-10.80



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo por el contacto con la piel
Nocivo si se inhala



"HECHO EN MÉXICO"



PRECAUCIÓN



Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com

FICHA TÉCNICA

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVO Y ENFERMEDAD AQUÍ RECOMENDADA”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

GOLPEADOR 100 CE es un insecticida perteneciente a la familia de los piretroides, formulado como concentrado emulsionable, que actúa por contacto e ingestión.

Es eficaz para combatir los insectos plaga, en los cultivos autorizados que a continuación se presentan:

Cultivo	Plaga	Nombre científico	Dosis (mL/Ha)	Observaciones
	Nombre común			
Sandía, Pepino, Melón, Calabaza, Chayote (3)	Mosquita blanca	<i>Bemisia argentifolii</i>	400-600	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días; iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros brotes de la plaga; volumen de aplicación 530-630 L de agua/Ha.

() Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Después de 24 horas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Preparación: Haga el cálculo de la cantidad necesaria de producto y de agua de dilución a utilizar, de acuerdo con el área que desea tratar. Siga las dosis aquí recomendadas.

Siempre que vaya a manipular el producto **GOLPEADOR 100 CE**, utilice el equipo de protección indicado en la sección de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO, para realizar con seguridad esta actividad.

A fin de evitar derrames o salpicaduras, desenrosque la tapa del envase cuidadosamente, hasta que el sello exterior se haya roto, retire la tapa y elimine el sello (de inducción) de seguridad interior.

Una vez que su equipo esté perfectamente calibrado, incorpore al tanque del equipo de aplicación, la mitad de la cantidad total de producto a utilizar, posteriormente, añada la mitad de la cantidad total de agua a utilizar, mezcle perfectamente y con precaución. Repita el paso anterior. Mezcle con precaución hasta obtener una mezcla perfectamente homogénea.

Aplicación: Para asperjar **GOLPEADOR 100 CE**, utilice boquillas que le permitan obtener una densidad mínima de 50 gotas/cm². Si utiliza equipos montados al tractor, asegúrese de que la velocidad de trabajo sea de 6-8 Km/h. Para aplicaciones en banda, utilice el número de boquillas necesarias para cubrir la totalidad del follaje del cultivo a tratar. La altura óptima de aspersión para las puntas de pulverización de 80° es de 75 cm, y 50 cm para las de 110° y el traslape mínimo entre las boquillas debe ser de un 30 %. Además, tenga en cuenta la altura del aguilón, que debe ir en función del estado fenológico del cultivo.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar cuando la temperatura sea mayor de 30 °C. Aplique a favor del viento, nunca en contra. No aplicar cuando la velocidad del viento sea mayor de 10 Km/h, y a fin de evitar deriva o acarreo del producto, realice las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o por la tarde. No aplicar en presencia de lluvia o cuando exista la posibilidad de la misma. No aplicar cuando el cultivo se encuentre bajo estrés.

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com

» FICHA TÉCNICA

FITOTOXICIDAD

GOLPEADOR 100 CE no es fitotóxico para los cultivos aquí recomendados, siempre y cuando se sigan las recomendaciones antes indicadas.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar **GOLPEADOR 100 CE** con otros productos. Sin embargo, si desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la aplicación.

“MANEJO DE RESISTENCIA”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVÍTE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.