

› FICHA TÉCNICA

“USO AGRÍCOLA”



Aguerrido

azufre elemental

FUNGICIDA
GRÁNULOS DISPERSABLES

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Azufre elemental (Equivalente a 800 g de i.a./kg).	80.00
INGREDIENTES INERTES:	
Dispersante, humectante y diluyente.	20.00
	Total: 100.00

No. de Registro: RSCO-FUNG-0302-X0205-343-80.0

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala



“HECHO EN INDIA”



Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

FICHA TÉCNICA

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

AGUERRIDO es un fungicida formulado a base de azufre elemental, preventivo y de contacto en presentación de gránulos dispersables; puede ser aplicado en los cultivos y enfermedades que se en listan a continuación:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Pepino, Melón, Calabaza, Calabacita, Sandía, Chayote (SL)	Cenicilla <i>(Erysiphe = Golovinomyces cichoracearum)</i>	200 – 400 g /100 L de agua	Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, inicial las aplicaciones cuando se presenten las condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad; volumen de aplicación 500 – 600 L de agua / ha.
() Intervalo de Seguridad: Es el tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL: Sin Límite. Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 4 horas después de la aplicación			

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Use el equipo de protección personal adecuado y completo (overol impermeable con capucha integrada, mascarilla equipada con cartuchos para vapores y filtro para partículas, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno). Para aplicarse, el producto debe ser diluido en agua limpia. Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar, abra la bolsa cortando la parte superior de la misma, realizando esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras. En 2 L de agua en un recipiente aparte de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico agregue la cantidad recomendada de **AGUERRIDO** medida con ayuda de una báscula y agite utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos, se puede utilizar un trozo de madera u otro material apropiado) hasta mezclar perfectamente. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor y agregue la cantidad de agua faltante, cierre el tanque y agite hasta mezclar perfectamente. Utilice la mezcla el mismo día de su aplicación.

CONTRAINDICACIONES:

No aplique **AGUERRIDO** en cucurbitáceas susceptibles, sin antes haber hecho una pequeña prueba. No aplicar **AGUERRIDO** en horas de calor intenso (temperaturas mayores a 35°C), ni cuando la velocidad del viento sea alta (15 km/h).

FITOTOXICIDAD:

AGUERRIDO no es fitotóxico siguiendo las dosis recomendadas para cada cultivo.

INCOMPATIBILIDAD:

No mezclar **AGUERRIDO**, con otros productos agroquímicos. Sin embargo, si se desea mezclar se recomienda que la mezcla se realice con los productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad previas a la aplicación.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600