

) FICHA TÉCNICA

"USO AGRÍCOLA"



FUNGICIDA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	9	6 EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:		
Azufre elemental: Azufre		
(Equivalente a 900 g de i.a./kg)		90.00
INGREDIENTES INERTES:		
Diluyente, humectante, dispersante y compuestos relacionados		10.00
	Total	100.00

No. de Registro: RSCO-FUNG-0302-022-002-090

Puede ser nocivo en caso de ingestión Puede ser nocivo por el contacto con la piel Puede ser nocivo si se inhala



"HECHO EN MÉXICO"

Carr. Panamericana Km 284 2da. Fraccion de Crespo C.P.: 38110 | Celaya, Gto. 461 192 0600



) FICHA TÉCNICA

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS" "INSTRUCCIONES DE USO" "SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

AZUFRE HUMECTABLE 90, es un fungicida preventivo y de contacto, cuyo ingrediente activo es azufre elemental formulado como polvo humectable. Puede ser aplicado en los cultivos y enfermedades que se enlistan a continuación:

	Enfermedad		Dosis	
Cultivo	Nombre común	Nombre cientifíco	kg/ha	
AGUACATE	Antracnosis	Colletotrichum gloeosporioides	200-600 g/100 L de agua Reaizar tres aplicaciones foliares a intervalo cuando se presente los primeros síntomas y las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 362-462 L de agua/ha	
CHÍCHARO FRIJOL	Chahuixtle o roya Cenicilla polvorienta Mancha de la hoja Verrucosis	Uromyces phaseoli Erysiphe polygoni, Erysiphe cichoracearum Cercospora spp Sphaceloma arachides	Use 7.0 kg/ha en suficiente agua para obtener un buen recubrimiento. Repita las aplicaciones en intervalos de 7- 14 días según se requiera.	
FRUTALES: MANZANO DURAZNO PERAL	Chahuixtle Pudrición café Mancha de la hoja Antracnosis Cenicilla polvorienta	Puccinia pruni spinosae Monilia fructicola Alternaria spp Colletotrichum spp Podosphaera leucotricha, Uncinula necator	Use 3.0-4.0 kg/400 L de agua cuando el árbol este en floración. En aplicaciones de recubrimiento reduzca la dosis a 1 kg si se esperan altas temperaturas.	
CÍTRICOS: LIMONERO MANDARINO NARANJO TORONJO	Fumagina Melanosis Antracnosis Cenicilla polvorienta	Capnodium citri Diaporthe citri Colletotrichum gloeosporioides Oidium tingitaninum, Oidium mangiferae	Use 2.5 kg/400 L de agua. Comience las aplicaciones a los primeros síntomas de daños y repita si es necesario.	
ROSAL	Cenicilla polvorienta Mancha de la hoja Fumagina	Sphaerotheca pannosa Mycosphaerella rosicola Capnodium spp	Use de 3.0-4.0 kg/400 L de agua. Aplique al primer síntoma de enfermedad. Mantenga los nuevos retoños protegidos.	

Carr. Panamericana Km 284 2da. Fraccion de Crespo C.P.: 38110 | Celaya, Gto. 461 192 0600



FICHA TÉCNICA

Recomendaciones: Use la dosificación más alta en los periodos de lluvias frecuentes. Aplique en suficiente agua para obtener un buen cubrimiento. Las aplicaciones pueden ser semanales o quincenales durante los períodos de crecimiento rápido.

Intervalo de Seguridad (IS): Es el tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **IS:** Cero días para todos los cultivos.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Use el equipo de protección personal adecuado y completo (overol impermeable con capucha integrada, mascarilla equipada con cartuchos para vapores y filtros para partículas, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno). Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar derrames y formación de nubes de polvo, para abrir el envase utilice un utensilio punzocortante (navaja o tijeras), realice un corte en el envase a lo largo de la parte punteada.

AZUFRE HUMECTABLE 90 debe ser aplicado en dilución con agua. Pese la cantidad de **AZUFRE HUMECTABLE 90** recomendada para la enfermedad a controlar con ayuda de una bascula y realice una premezcla en un recipiente aparte, añáda la premezcla al tanque de aplicación el cual debe contener la mitad del agua requerida, vierta el resto de agua, cierre el taque y agite enérgicamente hasta obtener una mezcla homogénea. Aplique el producto. Si se interrumple momentáneamente el tratamiento, vuelva a agitar el tanque antes de usarlo nuevamente.

CONTRAINDICACIONES

No se aplique **AZUFRE HUMECTABLE 90** en cultivos que se hayan tratado con emulsiones de aceite, ni a cultivos susceptibles, ni cuando haya temperauras mayores a 35°C. El azufre puede causar quemaduras en los pétalos de las flores formadas en alfalfa. NO aplicar Azufre en crisantemos cuando éstos estén en floración. NO aplicar Azufre en manzanos, frijol y cucurbitáceas susceptibles sin antes haber hecho una pequeña prueba.

FITOTOXICIDAD

AZUFRE HUMECTABLE 90 no es fitotóxico siguiendo las dosis recomendadas para cada cultivo.

INCOMPATIBILIDAD

NO mezclar este producto con otros productos agroquímicos.

"MANEJO DE RESISTENCIA"

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".



Carr. Panamericana Km 284 2da. Fraccion de Crespo C.P.: 38110 | Celaya, Gto. 461 192 0600