

FICHA TÉCNICA

“USO AGRÍCOLA”



COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Azufre elemental: Azufre (Equivalente a 930 g de i.a./kg)	93.00
INGREDIENTES INERTES:	
Diluyente y acondicionadores de fluidez	7.00
Total	100.00

No. de Registro: RSCO-FUNG-0302-024-001-093

Puede ser nocivo en caso de ingestión
 Puede ser nocivo por el contacto con la piel
 Puede ser nocivo si se inhala



“HECHO EN MÉXICO”








PRECAUCIÓN







Carr. Panamericana Km 284
 2da. Fraccion de Crespo
 C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

FICHA TÉCNICA

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

AZUFRE PERFECTO 93, es un fungicida preventivo y de contacto, cuyo ingrediente activo es azufre elemental. Debido a su gran actividad biológica y por sus características de polvo micro fino con propiedades altamente adhesivas puede ser aplicado en los cultivos y enfermedades que se listan a continuación:

Cultivo	Plaga		Dosis kg/ha
	Nombre común	Nombre científico	
HORTALIZAS			
CHÍCHARO FRIJOL	Cenicilla	<i>Erysiphe polygoni</i>	15-30
	Chahuixtle o roya	<i>Uromyces phaseoli</i>	15-30
	Mancha blanca	<i>Cercospora canescens</i>	15-30
	Antracnosis	<i>Colletotrichum sp</i>	15-30
FRESA	Cenicilla	<i>Sphaerotheca macularis</i>	15-30
PEPINO	Cenicilla	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	15-30
	Mildiu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	15-30
	Tizón temprano	<i>Alternaria cucumerina</i>	15-30
	Antracnosis	<i>Colletotrichum sp</i>	15-30
JITOMATE	Cenicilla	<i>Erysiphe polygoni</i>	15-30
	Tizón temprano	<i>Alternaria solani,</i> <i>Glomerella cingulata</i>	15-30
	Verrucosis	<i>Sphaceloma arachides</i>	15-30
	Antracnosis	<i>Colletotrichum sp</i>	15-30
FRUTALES			
AGUACATERO	Antracnosis	<i>Gloeosporium perseae</i>	50 - 70
	Fumagina	<i>Capnodium citri</i>	0.5 - 1.5 kg por árbol
	Araña roja del aguacatero	<i>Oligonychus punicae</i>	50-150
CIRUELO	Roya	<i>Tranzschelia discolor</i>	50 - 70
	Mancha foliar	<i>Alternaria sp</i>	50-70
MANZANO	Cenicilla	<i>Podospaera leucotricha</i>	50 - 70
	Roña	<i>Venturia inaequalis</i>	50 - 70
	Mancha foliar	<i>Alternaria sp</i>	50-70
DURAZNO	Cenicilla	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	50 - 70
	Verrucosis	<i>Taphrina deformans</i>	50 - 70
	Mancha foliar	<i>Alternaria sp</i>	50-70
MANGO	Cenicilla	<i>Oidium mangiferae</i>	50 - 150
	Araña roja del aguacatero	<i>Oligonychus punicae</i>	50 - 150
VID	Cenicilla	<i>Uncinula necator</i>	20-30
	Oídio de la vid	<i>Guignardia bidwellii</i>	20-30
CÍTRICOS			
NARANJO	Fumagina	<i>Capnodium citri</i>	0.5 - 1.5 kg por árbol
	Melanosis	<i>Diaporthe citri</i>	0.5 - 1.5 kg por árbol
	Antracnosis	<i>Colletotrichum spp</i>	0.5 - 1.5 kg por árbol
	Cenicilla	<i>Oidium tingitanium</i>	0.5 - 1.5 kg por árbol
	Roña	<i>Elsinoe fawcettii</i>	0.5 - 1.5 kg por árbol

Carr. Panamericana Km 284
 2da. Fraccion de Crespo
 C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

FICHA TÉCNICA

ORNAMENTALES			
ROSAL	Cenicilla	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	150 - 200 g/100 L de agua
CRISANTEMO	Cenicilla	<i>Erysiphe spp</i>	150 - 200 g/100 L de agua
CEMPASÚCHIL	Cenicilla	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	150 - 200 g/100 L de agua
<p>Intervalo de Seguridad (IS): Es el tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.</p> <p>IS: Cero días para todos los cultivos.</p> <p>Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación.</p>			

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Siempre utilice su equipo de protección personal indicado en la sección de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Utilice su equipo de protección personal. Abra el envase utilizando un utensilio punzocortante (navaja o tijeras), rasgando cuidadosamente donde indica la línea punteada para evitar la formación de nubes de polvo.

Pese la cantidad recomendada de **AZUFRE PERFECTO 93** con ayuda de una báscula, vierta de manera directa en el equipo de aplicación.

Para obtener mejores resultados aplique cuando el viento esté en calma, espolvoree lo suficiente para mantener el follaje y los frutos cubiertos con una capa uniforme y ligera. Utilice preferentemente maquinaria terrestre de fuerte golpe de aire. No utilizar aeroplano.

Para los casos en que **AZUFRE PERFECTO 93** se aplique con agua, pese la cantidad recomendada para la plaga a controlar de **AZUFRE PERFECTO 93** con ayuda de una báscula, y vierta de manera directa en un recipiente aparte para realizar una premezcla, vacíe agua en el tanque de aplicación hasta $\frac{3}{4}$ partes de la cantidad requerida, vacíe la premezcla en el tanque de aplicación y añada la cantidad de agua restante (agite mientras agrega el resto de agua), cierre el tanque y agite energicamente. Aplique el producto. Vuelva agitar el tanque antes de volver a usarlo si se interrumpe momentáneamente el tratamiento. Utilice la mezcla el mismo día de su aplicación.

CONTRAINDICACIONES:

No se aplique **AZUFRE PERFECTO 93** en cultivos que se hayan tratado con emulsiones de aceite, ni a cultivos susceptibles, ni cuando haya temperaturas mayores a 35°C. NO aplicar Azufre en crisantemos cuando éstos estén en floración. NO aplicar Azufre en manzanos, frijol y cucurbitáceas susceptibles sin antes haber hecho una pequeña prueba.

“FITOTOXICIDAD”

Este producto no es fitotóxico siguiendo las dosis recomendadas para cada cultivo.

“INCOMPATIBILIDAD”

NO mezclar este PRODUCTO con otros productos. Sin embargo, si desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la aplicación.

“MANEJO DE RESISTENCIA”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.