

› FICHA TÉCNICA

"USO AGRÍCOLA"




CONTRATIZON

cimoxanil + clorotalonil

POLVO
HUMECTABLE

FUNGICIDA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Cimoxanil: 1-[(EZ)-2-ciano-2-metoxiiminoacetil]-3-etilurea (Equivalente a 80 g de i.a./kg).	8.00
Clorotalonil: Tetracloroisoftalonitrilo (Equivalente a 720 g de i.a./kg).	72.00
INGREDIENTES INERTES:	
Diluyente, dispersante y humectante.	<u>20.00</u>
Total	100.00

No. de Registro: RSCO-MEZC-FUNG-0301J-0309-X0031-417-80.0



Tóxico si se inhala



"HECHO EN MÉXICO"

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

FICHA TÉCNICA

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVO Y ENFERMEDAD AQUÍ RECOMENDADA”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

CONTRATIZON es un fungicida en mezcla de Cimoxanil y Clorotalonil formulado como polvo humectable que actúa de manera sinérgica por contacto. Es recomendado su uso en el combate y control de las plagas en los cultivos autorizados:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (kg/ha)	OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre científico		
Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (3)	Mildiu	<i>(Pseudoperonospora cubensis)</i>	1.5-2.5	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten las condiciones adecuadas para el desarrollo de la enfermedad Utilizar un volumen de agua de 550-650 L de agua/ha.
Berenjena, Chile, Jitomate, Okra, Papa, Pimiento Morrón, Tomate verde (14)	Tizón tardío	<i>(Phytophthora infestans)</i>	2-3	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten las condiciones adecuadas para el desarrollo de la enfermedad Utilizar un volumen de agua de 500-600 L de agua/ha.
() Intervalo de Seguridad: Es el tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Después de 12 horas.				

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Utilice el equipo de protección personal indicado en la sección de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" y realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar derrames, para abrir la bolsa utilice un utensilio punzocortante (navaja o tijeras), realice un corte en la bolsa a lo largo de la parte punteada. Mida la cantidad específica de **CONTRATIZON** con ayuda de una báscula. Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Se sugiere agregar **CONTRATIZON** poco a poco mientras se está llenando el tanque del equipo aplicador o también mezclarlo completamente con agua en un tanque separado. Mantenga el tanque en constante agitación. Utilice la mezcla el mismo día de su aplicación.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicar cuando la temperatura sea mayor de 30°C. No aplicar cuando la velocidad del viento sea mayor de 10 km/h y a fin de evitar deriva o acarreo del producto, realice las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde.

FITOTOXICIDAD:

Carr. Panamericana Km 284
 2da. Fraccion de Crespo
 C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

