AGRO LUCAVA

› FICHA TÉCNICA

“USO AGRÍCOLA”

MICÒNATO

tiofanato de metilo

POLVO HUMECTABLE

FUNGICIDA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	**% EN PESO**
INGREDIENTE ACTIVO:	
Tiofanato metílico: Dimetil 4,4´-o-fenilenbis (3-tioalofanato) (Equivalente a 700 g de i.a/kg)	**70.00**
INGREDIENTES INERTES: Dispersante, humectante, fluidizantes y portador	**30.00**
TOTAL	**100.00**

No. de Registro: RSCO-FUNG-0369-309-002-070

Nocivo si se inhala

“HECHO EN MÉXICO”

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com

AGRO LUCAVA

FICHA TÉCNICA

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMESADES AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

Este producto es un fungicida sistémico y de contacto, selectivo a las enfermedades fungosas que se indican a continuación. Actúa de forma preventiva y curativa, distribuyéndose a todos los tejidos vegetativos controlando la infección.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (kg/ha)	IS (DÍAS)	OBSERVACIONES
Apio	Cenicilla	*(Oidium sp.)*	0.7 – 1.0	7	Aplicación al follaje
	Moho blanco	*(Sclerotinia sclerotiorum)*			
Berenjena, Tomate, Tomate de cáscara.	Pudrición de raíz y cuello	*(Fusarium oxysporum)*	0.5 – 1.5	21	Realizar 2 aplicaciones foliares a través del sistema de riego a intervalo de 14 dias, iniciar las aplicaciones al momento del trasplante; volumen de aplicación 950-1050 L/ha.
Papa				14	
Chile, Chile bell				7	
Cebolla, Ajo, Cebollín, Espárrago	Moho gris	*(Botrytis alli)*	1.0 - 1.5	1	Aplicación al follaje
Chabacano	Antracnosis	*(Colletotrichum sp.)*	60-100 g/100L agua	1	Aplicación al follaje
	Moho gris	*(Botrytis sp.)*			
	Pudrición morena	*(Monilia fructicola)*			
Ciruelo	Antracnosis	*(Colletotrichum sp.)*	60-100 g/100L agua	1	Aplicación al follaje
	Moho gris	*(Botrytis sp.)*			
	Pudrición morena	*(Monilia fructicola)*			
Durazno	Antracnosis	*(Colletotrichum sp.)*	60-100 g/100L agua	1	Aplicación al follaje
	Moho gris	*(Botrytis sp.)*			
	Pudrición morena	*(Monilia fructicola)*			
Fresa	Cenicilla	*(Sphaerotheca macularis)*	0.7-1.0	1	Aplicación al follaje
	Moho gris	*(Botrytis cinerea)*			
Frijol	Moho blanco	*(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.7-1.0	14	Aplicación al follaje
Limón mexicano, Limón persa, Naranjo, Lima, Tangerino, Toronjo,	Antracnosis	*(Colletotrichum gloeosporioides)*	60-100 g/100 L de agua	28	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 14 días, la 1ª en yema hinchada (antes de observarse los primeros botones florales) y la 2ª en flor abierta;

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com

Mandarino, Pomelo					volumen de aplicación 400-500 L/Ha.
Mango	Antracnosis	*(Colletotrichum gloeosporioides)*	60-150 g/100 L de agua	21	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 14 días, al inicio de la floración, cuando se presenten las condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad; volumen de aplicación 350-450 L/Ha.
Manzano	Antracnosis	*(Colletotrichum sp.)*	60-100 g/100L agua	1	Aplicación al follaje
	Moho gris	*(Botrytis sp.)*			
	Roña o sarna	*(Spilocaea pomi)*			
Melón	Antracnosis	*(Colletotrichum lagenarium)*	0.7-1.0	1	Aplicación al follaje
	Pudrición del tallo y raíz	*(Sclerotinia sclerotiorum.)*			
	Pudrición radical	*(Verticillium sp.)*			
Nectarino	Antracnosis	*(Colletotrichum gloeosporioides)*	60-100 g/100L agua	2	Aplicación al follaje
	Moho gris	*(Botrytis cinerea)*			
	Pudrición morena	*(Monilia fructicola)*			
Papa	Costra negra	*(Rhizoctonia solani)*	0.5-0.75	SL	Aplicación al fondo del surco al momento de la siembra
	Pudrición radical	*(Fusarium oxysporum)*			
Pepino	Antracnosis	*(Colletotrichum lagenarium)*	0.7-1.0	1	Aplicación al follaje
	Pudrición radical	*(Verticillium sp.)*			
	Pudrición de tallo y raíz	*(Sclerotinia sclerotiorum.)*			
Plátano	Sigatoka negra	*(Mycosphaerella fijiensis var. difformis)*	0.3-0.4	1	Aplicación al follaje
Piña	Pudrición de la raíz y cuello	*(Fusarium oxysporum)*	3 - 5	30	Realizar dos aplicaciones en drench a intervalo de 14 días, iniciar las aplicaciones al momento del trasplante; volumen de aplicación 50 mL/planta y 2000-2100 L de agua/ha
Sandia	Antracnosis	*(Colletotrichum lagenarium)*	0.7-1.0	1	Aplicación al follaje
	Pudrición de tallo y raíz	*(Sclerotinia sclerotiorum.)*			

	Pudrición radical	*(Verticillium sp.)*			
Trigo	Cenicilla	*(Erysiphe graminis)*	0.5-1.0	14	Aplicación al follaje
	Mancha de hojas y tallos	*(Septoria tritici)*			

IS= Intervalo de Seguridad, días que deben trascurrir entre la última aplicación y la cosecha; SL= Sin Límite. Tiempo de reentrada a los lugares tratados, 24 h después de realizada la aplicación.
Mantenga constante la dosis indicada, los intervalos de aplicación pueden variar dependiendo de la severidad de la enfermedad.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.
Acondicione el agua a un pH de 5 a 5.5 para una mejor acción del producto. Se debe preparar la mezcla agregando la dosis recomendada en una cubeta con un poco de agua y se agita hasta producir una suspensión uniforme. Vierta esta mezcla en el tanque de aplicación que contenga la suficiente cantidad de agua. Calibre su equipo de aplicación para asegurar un cubrimiento uniforme de las superficies tratadas al aspejar hasta el punto de goteo. Agite la mezcla cada vez que recargue la aspersora para asegurar una mezcla homogénea. Para mayor penetración foliar es recomendable agregar un coadyuvante. Realice las aplicaciones en horas tempranas del día o al atardecer.

CONTRAINDICACIONES: No aplique en soluciones de aspersión con un pH superior a 7 debido a que puede sufrir degradación, el pH óptimo de aplicación es de 5 a 5.5. Evite aplicarlo durante períodos de temperaturas superiores a 25^{o}C, así como en suelos con textura arenosa para evitar lixiviación.

Este producto es tolerado por los cultivos, no causa daño a los cultivos en su follaje, raíz o frutos a las dosis indicadas.

INCOMPATIBILIDAD: No lo mezcle con aceites ni sustancias alcalinas. Cuando se desconozca la compatibilidad con otro producto, realice una prueba física previa para evitar efectos no deseados. Los productos con que se mezcle deberán estar debidamente registrados.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com