

FICHA TÉCNICA

"USO AGRÍCOLA"



PROYECTIL 50 PH

benomilo

FUNGICIDA
POLVO HUMECTABLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Benomilo: Metil 1-(butilcarbamoil) bencimidazol-2-il carbamato. (Equivalente a 500 g de i.a./kg).	50.00
INGREDIENTES INERTES:	
Diluyente, humectante, dispersante y compuestos relacionados	50.00
Total	100.00

No. de Registro: RSCO-FUNG-0303-003-002-050



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo por el contacto con la piel
Nocivo si se inhala



"HECHO EN MÉXICO"



PRECAUCIÓN



Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com

FICHA TÉCNICA

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS”

**“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”**

Este producto es un fungicida sistémico preventivo y curativo recomendado para el control de enfermedades en los cultivos especificados en esta etiqueta. Es más efectivo en etapas tempranas del desarrollo de la infección, cuando se presenta los primeros síntomas de la enfermedad.

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (g/ha)	LMR
Aguacatero (30)	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	30-60 g /100 L de agua	0.5
	Fumagina	<i>Capnodium spp.</i>		
	Mancha de la hoja	<i>Cercospora purpurea</i>		
	Roña o sarna	<i>Sphaceloma perseae</i>		
Apio (7)	Tizón o mancha foliar	<i>Septoria apii</i>	200-250	3.0
	Tizón temprano	<i>Cercospora apii</i>		
Ciruelo (SL)	Fumagina	<i>Capnodium spp.</i>	60-90 g/ 100 L de agua	15.0
	Pudrición del fruto	<i>Monilinia fructicola</i>		
	Roña	<i>Venturia cerasi</i>		
CÍTRICOS (1) Limonero, Mandarino, Naranja, Toronjo	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	60-90 g/ 100 L de agua	10.0
	Cenicilla	<i>Oidium tingitaninum</i>		
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>		
Col (SL)	Pudrición de raíz y tallo	<i>Sclerotinia sp.</i>	1200	0.2
CUCURBITÁCEAS (SL) Calabacita, Melón, Pepino	Antracnosis	<i>Colletotrichum lagenarium</i>	300-350	
	Cenicilla	<i>Erysiphe cichoracearum</i>		
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>		
	Pudrición gomosa	<i>Mycosphaerella citrulina</i>		
Durazno (SL)	Fumagina	<i>Capnodium spp.</i>	60-90 g/ 100 L de agua	15.0
	Pudrición del fruto	<i>Monilinia fructicola</i>		
	Roña	<i>Cladosporium carpophilum</i>		
	Tiro de munición	<i>Coryneum beijerinckii</i>		
Fresa (SL)	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250-350	5.0
	Mancha de la hoja	<i>Mycosphaerella fragariae</i>		

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

FICHA TÉCNICA

Frijol (14)	Antracnosis	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	300- 500	2.0
	Moho blanco	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>		
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>		
Jitomate (1)	Antracnosis	<i>Colletotrichum phomoides</i>	400-500	5.0
	Mancha de la hoja	<i>Septoria lycopersici</i>		
	Moho gris	<i>Cladosporium fulvum</i>		
	Pudrición del fruto	<i>Botrytis cinerea</i>		
Mango (14)	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	40-60 g/100 L de agua	3.0
	Cenicilla	<i>Oidium spp.</i>		
	Fumagina	<i>Capnodium spp.</i>		
Manzano	Fumagina	<i>Capnodium spp.</i>	60-90 g/ 100 L de agua	7.0
	Pudrición amarga	<i>Glomerella cingulata</i>		
	Roña	<i>Venturia inaequalis</i>		
Peral (SL)	Fumagina	<i>Capnodium spp.</i>	60-90 g/ 100 L de agua	7.0
	Pudrición amarga	<i>Glomerella cingulata</i>		
	Sarna o roña	<i>Venturia pirina</i>		
Plátano (7)	Sigatoka amarilla o chamusco	<i>Mycosphaerella musicola</i>	60-90 g / 100 L de agua	1.0
	Sigatoka negra	<i>Mycosphaerella fijiensis var. Difformis</i>		
Soya (14)	Antracnosis	<i>Colletotrichum dematium</i>	300 - 500	2.0
	Mancha de la hoja	<i>Cercospora kikuchii</i>		
	Tizón de tallos y vainas	<i>Diaporthe phaseolorum</i>		
Vid (7)	Moho gris	<i>Botrytis spp</i>	50-70 g/ 100 L de agua	10..0
	Pudrición negra del fruto	<i>Guignardia bidwellii</i>		

() Intervalo de seguridad, días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha (SL= Sin Límite).

LMR = Límite Máximo de Residuos, tolerancia ppm.

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 24 hrs. Después de realizada la aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Acondicione el agua a un pH de 5 a 5.5 para una mejor acción del producto. Se debe preparar la mezcla agregando la dosis recomendada en una cubeta con un poco de agua y se agita hasta producir una mezcla uniforme. Vierta esta mezcla en el tanque de aplicación que contenga la suficiente cantidad de agua para asegurar un cubrimiento uniforme de las superficies tratadas, procurando asperjar hasta el punto de goteo. Agite la mezcla cada vez que recargue la aspersora para asegurar una mezcla homogénea. El volumen de agua a aplicar dependerá de la calibración del equipo aspersor.

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

» FICHA TÉCNICA

CONTRAINDICACIONES: Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación. No lo aplique en horas de calor intenso ni cuando el viento exceda los 15 km/h. No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de uso de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No lo mezcle con productos de reacción alcalina. Cuando se desconozca la compatibilidad con otro producto realice una prueba física previa para evitar efectos no deseados. Para las mezclas que se realicen con otros productos se recomienda utilizar los que cuenten con registro autorizado y vigente.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.”