

FICHA TÉCNICA

"USO AGRÍCOLA"



COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTES ACTIVOS:	
Clorpirifos: O,O-dietil O-3,5,6-tricloro-2-piridil fosforotioato (Equivalente a 350 g de i.a./L a 20° C).	33.90
Permetrina: 3-fenoxibencil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)- 2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 50 g de i.a./L a 20° C).	4.90
INGREDIENTES INERTES: Solvente y emulsificantes	<u>61.20</u>
TOTAL	100.00

No. de Registro: RSCO-MEZC-INAC-1105-X0011-009-38.80



Tóxico en caso de ingestión
Tóxico si se inhala



"HECHO EN MÉXICO"



PELIGRO



Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com

FICHA TÉCNICA

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

CARTUCHO (Clorpirifos + permetrina), es una mezcla de insecticidas de acción por contacto e ingestión, formulado como concentrado emulsionable. Es recomendado su uso en el combate y control de las plagas en los cultivos autorizados:

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Berenjena (7) Chile (7) Chile Bell (7)	Banderillo de Chile (<i>Anthonomus eugenii</i>)	1.00 – 1.25	Se deben realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos sobre el cultivo y su distribución tiene que ser homogénea. Use un volumen de agua de 350 a 450 L/ha. Asegurando una buena cobertura.
Chile (7)	Mosquita blanca de los invernaderos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1.00-1.50	Aplique al follaje, cuando aparezcan los primeros adultos.
Algodonero (21)	Gusano rosado del algodón (<i>Pectinophora gossypiella</i>)	1.50-2.00	Aplique al follaje, cuando aparezcan los primeros adultos.
Jitomate (7)	Minador serpentina del chile (<i>Liriomyza munda</i>) Gusano alfiler del tomate (<i>Keiferia lycopersicella</i>)	1.50-2.00	Cuando se tenga de 20-25% de hojas minadas (con larvas), aplique al follaje.
Maíz (21) Sorgo (21)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.75-1.00	Maíz: aplicar al cogollo y follaje preferentemente cuando aparezcan los primeros adultos (25% de planta dañada). Sorgo: Dirigir la aplicación al cogollo.
Soya (21)	Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera sp.</i>) Falso medidor de la soya (<i>Pseudoplusia includens</i>) Gusano soldado (<i>Mythimna sp.</i>) Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>)	1.50-2.00	Aplique al follaje, cuando empiecen a formar vainas y/o cuando se encuentren 10-15 larvas/100 plantas/10 masas de huevecillos y/o se encuentren larvas emergidas en 100 m lineales.

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com

FICHA TÉCNICA

Limón (34) Lima (34) Mandarino (34) Naranja (34) Pomelo (34) Tangerino (34) Toronjo (34)	Ácaro de dos manchas <i>(Tetranychus urticae)</i>	1.00-2.00 mL/ L de agua	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detecte la presencia de la plaga, adicionar un coadyuvante a las dosis recomendada en su etiqueta; volumen de aplicación sugerido 350-450 de agua/ha.
() Intervalo de Seguridad: Es el tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación.			

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Siempre utilice su equipo de protección personal indicado en la sección de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO . Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras, para abrir el envase, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Llene el tanque de aplicación hasta $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad con agua limpia, agregue la cantidad recomendada de **CARTUCHO** con ayuda de una probeta, completar su capacidad y mantener en constante agitación utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos, se puede utilizar un trozo de madera u otro material apropiado) hasta mezclar perfectamente. Aplique el producto. Vuelva agitar el tanque antes de volver a usarlo si se interrumpe momentáneamente el tratamiento.

CONTRAINDICACIONES:

Se sugiere hacer las aplicaciones temprano en la mañana, o por la tarde, cuando las temperaturas no sean altas. No aplicar si existe una alta probabilidad de lluvia próxima a fin de evitar la pérdida del producto por lavado. No aplicar si la velocidad del viento es alta (más de 10 kmh). No aplicar cuando las abejas y otros polinizadores estén en el cultivo.

INCOMPATIBILIDAD:

No mezclar **CARTUCHO** con otros productos agroquímicos.

“MANEJO DE RESISTENCIA”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com