AGRO LUCAVA

FICHA TÉCNICA

“USO AGRÍCOLA”

AGRO LUCAVA

LUCANAL 900-E

naled

INSECTICIDA Y/O ACARICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	**% EN PESO**
INGREDIENTE ACTIVO	
Naled: 1,2-Dibromo-2, 2-dicloroetil dimetilfosfato (Equivalente a 900 g de i.a/L a 20°C)	**58.00**
INGREDIENTES INERTES Disolvente, estabilizador, emulsificante y compuestos relacionados.	**42.00**
TOTAL	**100.00**

No. de Registro: RSCO-INAC-0150-007-009-060

Tóxico en caso de ingestión

“HECHO EN MÉXICO”

PELIGRO

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com

FICHA TÉCNICA

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS"

"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

LUCANAL 900-E es un insecticida acaricida que actúa por contacto e ingestión y en menor grado por inhalación.

Cultivo	Plaga	Dosis L/ha
Apio (1)	Chinche lygus: *Lygus spp*	1.0-1.5
Brócoli (7)	Gusano falso medidor de la col: *Trichoplusia ni*	1.0-1.5
Col (7) Col de Bruselas (7)	Pulgón de la col: *Brevicoryne brassicae* Gusano rayado de la col: *Leptophobia aripa* Gusano falso medidor de la col: *Trichoplusia ni* Gusano del corazón de la col: *Copitarsia consueta*	1.0-1.5 0.75-1.5 1.0-1.5 0.75-1.5
Coliflor (7)	Gusano falso medidor de la col: *Trichoplusia ni*	1.0-1.5
Espinaca (4)	Pulgón de la col: *Brevicoryne brassicae*	1.0-1.5
Lechuga (1)	Pulgón myzus*: Myzus persicae*	1.5-2.0
Calabacita (1)	Barrenador de la guía de la calabaza: *Melittia satyriniformis*	1.5-2.0
Pepino (1)	Gusano falso medidor de la col: *Trichoplusia ni*	1.5-2.0
Melón (1)	Mosquita blanca: *Bemisia tabaci, Trialeurodes sp*	1.5-2.0
Sandía (1)	Gusano falso medidor de la col: *Trichoplusia ni* Mosquita blanca: *Bemisia tabaci, Trialeurodes spp*	1.5-2.0 1.5-2.0
Chile (1)	Pulgón myzus: *Myzus persicae* Mosquita blanca de los invernaderos: *Trialeurodes vaporariorum*	1.5-2.0 1.5-2.0
Jitomate (1)	Minador de la hoja: *Liriomyza munda* Mosquita blanca de los invernaderos: *Trialeurodes vaporariorum* Gusano del fruto: *Heliothis spp.*	1.0-1.5 1.5-2.0 1.0-1.5
Berenjena (1)	Pulgón myzus: *Myzus persicae*	1.0-1.5
Durazno (7)	Pulgón myzus: *Myzus persicae* Araña roja: *Eotetranychus lewisi, Oligonychus mexicanus*	500 mL por 100 L de agua
Fresa (1)	Mosquita blanca: *Trialeurodes spp* Araña ciclamina: *Steneotarsonemus pallidus* Pulgón*: Pentatrichopus spp.*	1.0-2.0 1.5-2.0 1.5-2.0
Naranjo (7) Limonero (7)	Pulgón negro de los cítricos: *Toxoptera aurantii* Arador o negrilla de la naranja: *Phyllocoptruta oleivora* Pulgón del algodón: *Aphis gossypii* Mosquita blanca: *Dialeurodes citri* Mosquita algodonosa: *Aleurothrixus floccosus*	150 mL por 100 L de agua
Nogal (7)	Pulgón amarillo: *Monellia costalis* Pulgón negro: *Melanocallis caryaefoliae*	150 mL por 100 L de agua
Vid (4)	Chicharrita de la vid: *Dikrella cockerelli*	0.75-1.0
Arroz (1)	Chinche del arroz: *Oebalus insularis* Gusano medidor de la soya: *Pseudoplusia includens* Palomilla blanca del arroz: *Rupella albinella*	1.0-1.5 1.0-1.5 1.0-1.5

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com

FICHA TÉCNICA

Frijol (15)	Conchuela del frijol: *Epilachna varivestis* Mosquita blanca de los invernaderos: *Trialeurodes vaporariorum*	1.0 1.0-1.5
Algodonero (4)	Chinche rápida: *Creontiades spp* Chinche lygus: *Lygus spp* Mosquita blanca: *Bemisia tabaci* Gusano peludo: *Estigmene acrea*	1.5-2.0 1.5-2.0 1.5-2.0 1.5-2.0
Cártamo (4)	Pulgón myzus: *Myzus persicae*	1.0-1.5
Tabaco (4)	Mosquita blanca: *Bemisia tabaci*	1.0-1.5
Ornamentales (Sin límite)	Mosquita blanca: *Bemisia tabaci*	125 mL por 100 L de agua
( ) Intervalo de seguridad en días. **Tiempo de reentrada a las zonas tratadas:** 48 horas después de la aplicación.		

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras, para abrir el envase, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar.

Llene el tanque de aplicación hasta ¾ partes de su capacidad con agua limpia, agregue la cantidad recomendada de **LUCANAL 900-E** con ayuda de una probeta, completar su capacidad y mantener en constante agitación utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos, se puede utilizar un trozo de madera u otro material apropiado) hasta mezclar perfectamente.

Este producto se puede aplicar con aspersoras manuales, motorizadas o con avión. Los volúmenes del agua para la mezcla son de 40-80 L, en el caso de aplicación aérea y de 200 a 400 L por ha con aplicaciones terrestres o manuales, ya sea de mochila o tractor, esto dependiendo del resultado que se obtenga al momento de la calibración del equipo.

CONTRAINDICACIONES: No aplique **LUCANAL 900-E** a temperaturas mayores de 35°C, ni en cucurbitáceas susceptibles sin antes haber hecho una pequeña prueba.

INCOMPATIBILIDAD: LUCANAL 900-E es compatible con insecticidas y fungicidas, es incompatible con materiales alcalinos, caldo bordelés, cal o cualquier material con pH mayor de 7.5.

FITOTOXICIDAD: LUCANAL 900-E no es un producto fitotóxico siguiendo las dosis recomendadas para cada cultivo.

"MANEJO DE RESISTENCIA": "PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com