

FICHA TÉCNICA

"USO AGRÍCOLA"



LUCATER-5G
terbufos
INSECTICIDA Y/O NEMATICIDA
GRANULADO

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Terbufos: S-[[[1,1-Dimetiletil]tio]metil]O,O-dietil fosforoditioato (Equivalente a 50 g de i.a./kg)	5.00
INGREDIENTES INERTES:	
Portador granulado y Acondicionador	95.00
TOTAL	100.00

No. de registro: RSCO-INAC-0163-320-005-005



Mortal en caso de ingestión
Mortal por el contacto con la piel
Mortal si se inhala



"HECHO EN MÉXICO"



PELIGRO

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

FICHA TÉCNICA

**“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”**

LUCATER-5G es un insecticida y/o nematocida organofosforado formulado a base de Terbufos para su aplicación en gránulos.

Cultivo	Plagas	Dosis kg/ha	Observaciones
MAÍZ (60)	Diabrotica o doradilla: <i>Diabrotica spp.</i> Gallina ciega: <i>Phyllophaga spp.</i>	20-25	Aplicación en banda al momento de la siembra o en la primera escarda.
PLÁTANO (60)	Gusano de la base del tallo <i>Cosmopolites sordidus</i>	50 mg /planta	Aplicar alrededor de los hijuelos, en banda semicircular de 50-60 cm de radio. En trasplante o plantaciones nuevas, aplicar 50 g en la cepa antes de introducir el rizoma.
TABACO (60)	Diabrotica o doradilla: <i>Diabrotica spp.</i> Gallina ciega: <i>Phyllophaga spp.</i>	60	Aplicaciones en banda al momento del trasplante
() Intervalo de seguridad: Días entre la última aplicación y cosecha. Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 48 horas después de la aplicación.			

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar derrames, para abrir la bolsa utilice un utensilio punzocortante (navaja o tijeras), realice un corte en la bolsa a lo largo de la parte punteada. Mida la cantidad específica de con ayuda de una báscula. **LUCATER-5G** no requiere preparación previa para su aplicación por ser un producto granulado, y su aplicación es directa. Emplear aspersoras motorizadas para aplicación de gránulos.

CONTRAINDICACIONES: No se aplique ni permita que el producto caiga sobre áreas ocupadas por seres humanos. No aplicar el producto en horas de calor intenso (temperaturas mayores a 35°C) ni aplicar contra el viento.

FITOTOXICIDAD: **LUCATER-5G** no es fitotóxico siguiendo las dosis recomendadas para cada cultivo.

INCOMPATIBILIDAD:

No mezclar **LUCATER-5G** con otros productos. Sin embargo, si desea mezclar se recomienda que la mezcla se realice con los productos registrados ante la autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad previas a la aplicación.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600