

“USO AGRÍCOLA”

LUCARFURÁN 5G carbofuran

Granulado

Insecticida y/o Nematicida

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Carbofuran: 2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-il metilcarbamato (Equivalente a 50 g de i.a./kg)	5.00
INGREDIENTES INERTES:	
Diluyente granulado, adherente, colorante y compuestos relacionados	95.00
Total	100.00

No. de Registro: RSCO-INAC-0110-311-005-005



Tóxico en caso de ingestión
Tóxico si se inhala



“HECHO EN MÉXICO”



www.grupolucava.com

Química Lucava S.A. de C.V

Carretera Panamericana Km. 284 2a Fracción de Crespo
C.P. 38110 Celaya, Gto. México.
01 800 752 7478

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

LUCARFURÁN 5G, es un insecticida y/o nematicida carbámico de uso agrícola, de acción sistémica, por contacto, e ingestión, recomendado para el combate y control de las plagas que se indican, en los siguientes cultivos.

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS Kg/ Ha	OBSERVACIONES
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
ALFALFA (28)	Gusano de alambre	<i>Melanotus</i> sp.	40-50	Aplicase distribuyéndolo uniformemente y dar un riego. Si se aplica antes de la siembra es preferible incorporarlo antes de regar. Úsele las dosis mayores en infestaciones altas. Para el caso de Diabrotica, aplicar una vez por corte.
	Picudo egipcio de la alfalfa	<i>Hypera brunneipennis</i>		
	Picudo del chícharo	<i>Acyrtosiphon pisum</i>		
	Diabrotica o doradilla	<i>Diabrotica</i> spp.		
ARROZ (40)	Chicharrita o defalcado del arroz	<i>Sogatia furcifera</i>	20-30	En aplicación total debe efectuarse uniformemente la primera aplicación a los 25-30 después de la germinación. Use las dosis altas cuando aplique una sola vez en la temporada o las dosis bajas en 2 aplicaciones con 30 días de intervalo. Dejar un intervalo de 20 días si se usa antes o después de aplicar Propanil.
	Falsa chicharrita del arroz	<i>Sogatia cubana</i>		
	Barrenador del tallo	<i>Chilo</i> sp.		
	Picudo acuático del arroz	<i>Lissorhoptrus oryzophilus</i>		
CACAHUATE (60)	Nematodo agallador	<i>Meloidogyne</i> spp.	20-30	Aplicase al suelo distribuyéndolo en banda o en círculo de 20 cm de ancho al fondo del surco o a lo largo de la hilera antes del primer aporque.
	Nematodo radical	<i>Pratylenchus</i> spp.		
CAFETO (15)	Minador de las hojas del cafeto	<i>Leucoptera coffeella</i>	Semilleros: 10-15 g /m ²	Aplicase a 5-10 cm de profundidad antes de sembrar.
			Almácigo: 1 g /maceta	Aplicase en 3 hoyitos de 2 cm de profundidad, retirados del tallo.
	Gallina ciega	<i>Phyllophaga</i> spp.	Plantaciones nuevas: 10-15 g /planta	Incorpórese la mitad de la dosis dentro del hoyo y el resto sobre la superficie después de plantar.
	Nematodo agallador	<i>Meloidogyne</i> spp.	Plantaciones establecidas: 20-30 g /árbol	Aplicase alrededor de la planta hasta una distancia de 0.5 a un metro del tronco.
CALABACITA (21)	Diabrotica o doradilla	<i>Diabrotica</i> spp.	Almácigos: 6-12 g /m ² 30-40 Kg en banda 30-40 g /10 m de hilera Mateado: 2.5 g / planta	Incorpórese antes de la siembra a una profundidad de 5-10 cm y riéguese. Colóquese al suelo distribuyéndolo en bandas o círculos de 25 cm de ancho al fondo del surco con la semilla al trasplante o a lo largo de la hilera antes del primer aporque.
CHILE (21)	Minador de la hoja	<i>Liriomyza</i> spp.		
	Gusano trozador	<i>Spodoptera ornithogalli</i>		
	Pulgón mizus	<i>Myzus persicae</i>		
	Minador de la hoja	<i>Liriomyza</i> spp.		
FRESA (60)	Diabrotica o doradilla	<i>Diabrotica</i> spp.		
	Minador de la hoja	<i>Liriomyza</i> spp.		
MELÓN (60)	Diabrotica o doradilla	<i>Diabrotica</i> spp.		
PEPINO (60)	Minador de la hoja	<i>Liriomyza</i> spp.		
SANDÍA (60)	Pulgón mizus	<i>Myzus persicae</i>		
CAÑA DE AZÚCAR (28)	Mosca pinta	<i>Aeneolamia postica</i>	15-20	En soca o a la siembra dirigido a la base de la cepa. A la siembra incorporado próximo a la semilla.
	Barrenador común de la caña de azúcar	<i>Diatraea saccharalis</i>	70-80 g /10 m hilera	
MAÍZ (40)	Gusano trozador	<i>Spodoptera ornithogalli</i>	En banda : 15-20 kg	
	Diabrotica o doradilla	<i>Diabrotica</i> spp.		

	Gusano de alambre	<i>Melanotus</i> spp.	En hilera: 15-20 g /10 m Mateado: 3-4 g /10 plantas En banda: 30-40 kg En hilera: 30-40g./10 m	Colóquelo al suelo a la siembra distribuyéndolo en bandas o en círculos de 20 cm alrededor de la semilla.
	Gallina ciega	<i>Phyllophaga</i> spp.		
	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	15-20 kg	Colocar al follaje dirigiéndolo al cogollo cuando las larvas sean pequeñas. Use las dosis altas para larvas mayores de 1 cm.
	Barrenador grande del maíz	<i>Diatraea grandiosella</i>		
PAPA (60)	Pulga saltona negra	<i>Epitrix</i> spp.	En banda: 40-50 Kg En hilera: 40-50 g /10m	Aplicarse al suelo distribuyéndolo en bandas o círculos de 20 cm de ancho al fondo del surco con la semilla o a lo largo de la hilera antes del primer aporque.
	Gallina ciega	<i>Phyllophaga</i> spp.		
	Pulgón de la papa	<i>Macrosiphum solanifolii</i>		
	Nematodo radical	<i>Pratylenchus</i> spp.		
	Nematodo agallador	<i>Meloidogyne</i> spp.		
PLÁTANO (60)	Barrenador de la base del tallo	<i>Cosmopolites sordidus</i>	30-40 g /unidad de producción	Colóquese al suelo en un círculo completo de 15 cm alrededor de cada planta en época antes de riego o de lluvia. Repítase cada 4-5 meses. Aplíquese la mitad de la dosis dentro del hoyo en aplicaciones a la siembra, tapar y aplicar el resto en la superficie.
SORGO (30)	Gallina ciega	<i>Phyllophaga</i> spp.	20 kg En banda: 30-40 kg En hilera: 30-40 g./10 m	Aplicarse al suelo a la siembra distribuyéndolo en banda o círculo de 20 cm. alrededor de la semilla.
	Gusano de alambre	<i>Agriotes lineatus</i>		
	Gusano trozador	<i>Spodoptera ornithogalli</i>		
	Gusano norteño de la raíz de maíz	<i>Diabrotica longicornis</i>		
TABACO (60)	Gusano torzador	<i>Spodoptera ornithogalli</i>	En almácigos: 10-15 g /m ² En banda: 40-50 kg En hilera: 40-50 g /10 m Mateado: 2-2.5 g /planta	Antes de la siembra incorpórese a una profundidad de 2-10 cm y riéguese. Aplíquese de 7 - 10 días después del trasplante en bandas o en círculos de 20 cm alrededor de la planta.
VID (60)	Nematodo radical	<i>Aphelenchus</i> spp.	50 - 100 kg	Distribúyase en la superficie de las calles, incorporando y regando posteriormente. Calcule la dosis requerida dependiendo del ancho de la franja que se va a tratar. No se aplique en suelos con pH superior a 8.0

() INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

PERIODO DE REINGRESO A LUGARES TRATADOS: 24 horas después de la aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Abra el empaque por la pestaña superior, evitando inhalar o tener contacto con el producto. **LUCARFURÁN 5G** no requiere preparación, se aplica tal y como viene. Puede usarse equipo manual o tractor, procurando distribuir el producto siempre en forma uniforme ya sea en aplicación total o en banda.

Aplicaciones al suelo: **LUCARFURÁN 5G** cuando es aplicado al suelo, es absorbido a todas las partes vegetativas de la planta. Para el control de insectos y nematodos, aplíquese próximo al sistema de raíces del cultivo, de preferencia incorporándolo a una profundidad de 2 a 10 cm. Después de la aplicación de un riego para que **LUCARFURÁN 5G** empiece a actuar. En cultivos de temporal efectúese el tratamiento próximo a lluvias.

LUCARFURÁN 5G también puede usarse en aplicaciones totales cubriendo al voleo toda la superficie o en banda a lo largo de la hilera o mateado.

Aplicaciones al follaje: **LUCARFURÁN 5G** cuando es aplicado al follaje, actúa por la vía estomacal y por contacto. Úsese los sistemas convencionales de aplicación.

CONTRAINDICACIONES: No pastorear ganado en áreas tratadas con este producto. No se aplique en las horas de calor intenso ni cuando la velocidad del viento sea alta (más de 15 Km/hora). No aplique al nivel de la cara. Su eficacia se reduce en suelos con condiciones secas. No aplicar en suelos muy húmedos o encharcados, ni en cultivos que crezcan bajo cubierta plástica. La eficacia del tratamiento puede disminuir cuando la biodegradación es rápida, lo que disminuye la concentración del ingrediente activo. No aplicar en un mismo lugar más de 1 vez en 2 años para reducir el riesgo de estimular la biodegradación. No aplicar a mano. En fresa debe aplicarse después de la última cosecha del año y en arroz antes de inundar o 3 semanas después de inundar.

INCOMPATIBILIDAD: No se mezcle ni aplique con productos de naturaleza alcalina. Cuando se desconozca la compatibilidad de algunas mezclas, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para determinar si hay efectos fitotóxicos. Para la mezcla con otros productos, se recomienda utilizar aquellos que cuenten con registro sanitario vigente para los cultivos aquí recomendados. Después de una aplicación con propanil deben transcurrir 3 semanas antes de aplicar carbofuran y viceversa.

“MANEJO DE RESISTENCIA”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”



PRECAUCIÓN

