

FICHA TÉCNICA

“USO AGRÍCOLA”



COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Malation: Dietil (dimetoxifosfinotioilto) succinato. (Equivalente a 1169 g de i.a./L a 20°C).	95.00
INGREDIENTES INERTES:	
Impurezas y compuestos relacionados.	5.00
Total	100.00

No. de Registro: RSCO-INAC-0143-107-014-095



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo si se inhala



“HECHO EN MÉXICO”



PRECAUCIÓN



Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com

FICHA TÉCNICA

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

LUCATHION UBV es un insecticida organofosforado formulado a base de malation en presentación de solución concentrada acuosa que actúa por contacto e ingestión, listo para aplicarse a la dosis recomendada, en aspersión a ultra bajo volumen de acuerdo a las siguientes recomendaciones:

Cultivo	Dosis L/ha	Plaga	Nombre científico	Observaciones
Chile (3)	1.5-2.0	Picudo del chile	Anthonomus eugenii	Aplicación al follaje.
Algodonero (SL)	1.25-1.50	Picudo del algodónero	Anthonomus grandis	
Mango (2)	1.0-2.0	Mosca de la fruta	Anastrepha ludens	Aplicar en los laterales de las hileras de los arboles. Se recomienda mezclar con proteína hidrolizada a una dosis de 4.22 ml/ L de producto.
Naranja	1.0-2.0	Mosca de la fruta	Anastrepha ludens	
Limonero				
Lima				
Tangerino	1.0-2.0	Mosca de la fruta	Anastrepha ludens	
Toronjo (2)				
() Intervalo de seguridad: Días entre la última aplicación y cosecha. (SL) Sin límite.				
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 horas después de la aplicación.				

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Utilice su equipo de protección personal. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras, abra el envase, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar.

LUCATHION UBV está listo para aplicarse, mida la cantidad recomendada de **LUCATHION UBV** con ayuda de una probeta, vacíe en el equipo de aplicación y aplique directamente al cultivo. Utilizar equipo de ultra bajo volumen (UBV) con un equipo con pulverizador de disco rotativo.

CONTRAINDICACIONES: Se recomienda hacer la aplicación en las primeras horas de la mañana. No se aplique en las horas de calor intenso.

FITOTOXICIDAD: **LUCATHION UBV** no es fitotóxico siguiendo las dosis recomendadas para cada cultivo.

INCOMPATIBILIDAD: NO mezclar **LUCATHION UBV** con otros productos. Sin embargo, si desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la aplicación.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fracción de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com