

FICHA TÉCNICA

“USO AGRÍCOLA”



COMPOSICIÓN PORCENTUAL		% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO		
Ametrina: 2-etilamino-4-isopropilamino-6-metiltio-s-triazina (Equivalente a 255 g de i.a./L a 20° C)	No menos de	25.50
2,4-D: Ester isobutílico del ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (Con un contenido de ácido no menor de 79.78%) (Equivalente a 130.9 g de i.a./L a 20°C)	No menos de	16.40
INGREDIENTES INERTES		
Solventes y emulsificantes	No más de	58.10
	TOTAL	100.00
No. de Registro: RSCO-MEZC-1207-301-009-041		



Nocivo si se inhala



“HECHO EN MÉXICO”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN”

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com

FICHA TÉCNICA

PICAÑA, es un herbicida selectivo que actúa sobre el follaje de las malezas establecidas. Está diseñado para ser aplicado en post-emergencia temprana, sobre las malezas que tengan un desarrollo inicial de 2 a 15 cm de altura. Se recomienda su uso, en los cultivos de caña de azúcar y maíz.

PICAÑA, es una mezcla de dos herbicidas: ametrina (de acción residual y gran efecto sobre zacates anuales) y 2,4-D (con rápido efecto por contacto).

USO RECOMENDADO:

Cultivo	Dosis L/ha	Altura de la maleza	Observaciones
CAÑA DE AZÚCAR	5.0	2-5 cm	Aplicación en post-emergencia temprana.
	6.0	6-10 cm	
	8.0	11-15 cm	
MAÍZ	4.0	2-5 cm	Tratamiento de post-emergencia. Aplicación dirigida, evitando mojar los tallos con la aspersión. Solamente en maíz de más de 20 cm de altura.
	5.0	6-10 cm	

MALEZAS QUE CONTROLA

Nombre común	Nombre científico	Nombre común	Nombre científico
Chilillo	<i>Cleome aculeata</i>	Zacate pitillo	<i>Ixophorus unisetus</i>
Golondrina	<i>Euphorbia sp</i>	Muela de caballo	<i>Brachiaria sp</i>
Acahualillo	<i>Bidens sp</i>	Pata de gallo	<i>Eleusine indica</i>
Tomatillo	<i>Physalis angulata</i>	Cebollin o coquillo	<i>Cyperus spp</i>
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	Privilegio	<i>Panicum maximum</i>
Quelite o bledo	<i>Amaranthus sp</i>	Cenizo	<i>Chenopodium album</i>
Tronadora	<i>Crotalaria sp</i>	Lechuguilla	<i>Sonchus sp</i>
Estrellita	<i>Galinsoga parviflora</i>	Fresadilla	<i>Digitaria sanguinalis</i>
Balsilla	<i>Phyllanthus niruri</i>	Toloache	<i>Datura sp</i>
Zacate pinto	<i>Eragrostis diffusa</i>	Zacate azul	<i>Poa annua</i>
Zacate de año	<i>Panicum fasciculatum</i>	Diente de león	<i>Taraxacum officinale</i>
Cola de zorra	<i>Setaria spp</i>	Lengua de vaca	<i>Rumex spp.</i>

TIEMPO DE REENTRADA A ZONAS TRATADAS: 12 horas después de la aplicación

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Agite el envase antes de usar el producto. Para abrir el envase desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Para aplicarse debe ser diluido en agua limpia. Vierta el agua en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico, agregue la cantidad recomendada de **PICAÑA** y agite utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos) hasta mezclar perfectamente. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor. Mantenga en constante agitación mientras se aplica.

Con un equipo de mochila se recomienda utilizar de 200 a 600 litros de agua por hectárea y con equipo de tractor utilice de 400 a 600 litros de agua por hectárea.

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

› FICHA TÉCNICA

PICAÑA debe aplicarse cuando la mayoría de las malezas hayan brotado y se encuentren en vegetación activa, teniendo de 3-4 hojas máximo o antes de que amacollen los zacates.

PICAÑA persiste de 3 a 5 meses en el suelo, por lo que deberá tenerse en cuenta si se pretende hacer rotación de cultivos.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar **PICAÑA**, cerca de cultivos susceptibles, ni asociados con los cultivos aquí recomendados. No aplicar cuando la velocidad del viento sea mayor a 10 Km/h. Ni cuando esté próxima una lluvia.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con productos de reacción alcalina. Si se requiere aplicarlo en mezcla con otros productos, deberá realizar una prueba previa a fin de comprobar efectos fitotóxicos. La mezcla deberá hacerse con productos registrados para los cultivos especificados en ésta etiqueta.

FITOTOXICIDAD: **PICAÑA** no causa ningún efecto fitotóxico, en los cultivos y las dosis indicadas en ésta etiqueta.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.



PRECAUCIÓN

