

› FICHA TÉCNICA

“USO AGRÍCOLA”

PICLORAM +2,4-D SL

picloram + 2,4-D

Concentrado Soluble

Herbicida

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTES ACTIVOS:	
Picloram: 4-amino-3,5,6-tricloropiridina-2-acido carboxilico (Equivalente a 64 g de i.a./L a 20°C)	5.55
2,4-D: Sal dimetilamina del acido 2,4-Diclorofenoxiacetico (Con un contenido de acido 2,4-D no menor de 83%) (Equivalente a 240 g de i.a./L a 20°C)	20.82
INGREDIENTES INERTES:	
Neutralizador, surfactante y agua.	73.63
	TOTAL : 100.00
No. de Registro: RSCO-MEZC-1219-313-375-026	CONTENIDO NETO:



Nocivo si se inhala

“HECHO EN MÉXICO”



“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

Picloram + 2,4-D SL es un herbicida selectivo y sistémico que actúa en el control de las especies de malezas que se indican a continuación.

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com

FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Escobilla	<i>Sida acuta</i>
Dormilona	<i>Mimosa pudica</i>
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>
Hierba Martina	<i>Hyptis verticillata</i>

Aplique en:

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Pastizales establecidos en potreros (14)	1.5-2.0	Realizar una aplicación total en postemergencia a la maleza y al cultivo, debe aplicarse en pastos establecidos como potreros.

() INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la entrada del ganado.

TIEMPO DE REENTRADA A ZONAS TRATADAS: 48 horas después de la aplicación.

MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN: Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla, en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **Picloram + 2,4-D SL** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato.

CONTRAINDICACIONES: No aplique **Picloram + 2,4-D SL** cuando la temperatura sea muy elevada o existan vientos con velocidad mayor de 15 km/h. No aplicar en condiciones de sequía o terrenos inundados; evite el pastoreo por lo menos dos semanas después de la aplicación para ayudar a la recuperación del potrero.

FITOTOXICIDAD: **Picloram + 2,4-D SL** no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar **Picloram + 2,4-D SL** con productos que tengan reacción fuertemente alcalina. Si se desconoce la compatibilidad de algunas mezclas, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación. En caso de ser mezclado solo se podrá hacer con aquellos productos que cuenten con registro vigente ante la autoridad competente.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ÉSTE PRODUCTO,

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

› **FICHA TÉCNICA**

ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

