AGRO LUCAVA

FICHA TÉCNICA

“USO AGRÍCOLA”

AGRO LUCAVA

SINGULAR

imidacloprid

INSECTICIDA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
Ingrediente Activo: **Imidacloprid**: (E)-1-(6-Cloro-3-Piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina (Equivalente a 350 g de i.a. /L a 20 °C)	**30.20**
Ingredientes Inertes: Diluyente, estabilizante, espesante, humectante, dispersante, conservador, antiespumante y colorante	**69.80**
TOTAL:	**100.00**

Registro único: RSCO-INAC-0199-X0058-064-30.2

Nocivo si se inhala
Nocivo por el contacto con la piel
Nocivo en caso de ingestión

“HECHO EN MÉXICO”

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com

FICHA TÉCNICA

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

SINGULAR es un insecticida sistémico con actividad translaminar de acción de contacto y estomacal. Se recomienda su uso en los cultivos abajo descritos y para el control de las plagas que a continuación se mencionan:

Cultivos	Plagas (Nombre Científico)	Dosis (L/ha)	Observaciones
Aguacate (7)	Chicharrita *(idona minuenda)* Trips *(Frankliniella occidentalis)* Trips *(Scirtothrips perseae)*	250-300 mL/1000 L de agua	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 950-1050 L de agua/ha.
Berenjena (21) Chile (21) Tomate Verde (21) Jitomate (21) Papa (7)	Mosquita Blanca *(Bemisia tabaci)*	0.75-1.0	Realizar dos aplicaciones en drench a intervalo de 7 días, iniciando 5 días después del trasplante, volumen de aplicación 50 mL de mezcla/planta.
Cidro (SL) Lima (SL) Limón (SL) Mandarina (SL) Naranja (SL) Pomelo (SL) Tangerino (SL) Toronjo (SL)	Psílido asiático de los cítricos *(Diaphorina citri)*	0.03-0.05 L / 100 L de agua	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecte la presencia de la plaga, volumen de aplicación 146-246 L de agua/ha.
Arroz (15) Avena (15) Cebada (15) Centeno (15) Maíz (15) Sorgo (15) Trigo (15) Triticale (15)	Pulgón Amarillo *(Melanaphis saccharis)*	0.2-0.3	Realizar dos aplicaciones al follaje cuando se detecte la presencia de la plaga, volumen de aplicación 340-440 L de agua/ha.
Calabacita (21) Calabaza (21) Chayote (21) Melón (21) Pepino (21) Sandía (21)	Mosquita Blanca *(Bemisia tabaci)*	0.75-1.0	Realizar una aplicación al follaje al detectar la presencia de ninfas y adultos; volumen de aplicación 470-570 L de agua/ha.

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com

FICHA TÉCNICA

Fresa (30) Frambuesa (30) Zarzamora (30)	Mosquita Blanca *(Bemisia tabaci)*	0.25-0.45	Realizar 3 aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 días; volumen de aplicación 575 – 675 L de agua/ha.
Piña (30)	Piojo harinoso *(Dysmicoccus brevipes)*	0.5-1.0	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 10 días.
Brócoli (21) Col (21) Col de Bruselas (21) Coliflor (21) Colinabo (21) Colza (21) Mostaza (21)	Pulgón cenizo *(Brevicoryne brassicae)* Pulgón verde *(Myzus persocae)*	Pretransplante: 300-500 mL/ha Drench: 500-1000 mL/ha	Realizar 2 aplicaciones: la primera en pretransplante, por inmersión de charola, con un volumen de aplicación sugerido de 100-200 L de agua/ha y la segunda 7 días después, en aplicación en drench; con un volumen de aplicación sugerido de 950-1050 L/ha.
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 horas **( ) INTERVALO DE SEGURIDAD:** Días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.			

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Siempre utilice su equipo de protección personal indicado en la sección de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras, para abrir el envase, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Llene el tanque de aplicación hasta ¾ partes de su capacidad con agua limpia, agregue la cantidad recomendada de **SINGULAR** con ayuda de una probeta, completar su capacidad y mantener en constante agitación utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos, se puede utilizar un trozo de madera u otro material apropiado) hasta mezclar perfectamente.

La aplicación foliar puede ser realizada con equipo de mochila manual o de motor, montado al tractor, el cual debe ser calibrado para aplicar la dosis recomendada en el volumen de agua calculado y en la superficie correspondiente.

CONTRAINDICACIONES: Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de mañana. No se aplique en horas de calor intenso ni cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/hora) o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del producto.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar **SINGULAR** con otros productos. Sin embargo, si se desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la aplicación.

FITOTOXICIDAD: SINGULAR no es fitotóxico para los cultivos aquí indicados si es aplicado siguiendo las instrucciones de uso de esta etiqueta.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com