

› FICHA TÉCNICA



COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	
<b>Gentamicina:</b> Sulfato de Gentamicina (Equivalente a 100 g de i.a./kg)	10.00
<b>Oxitetraciclina:</b> Clorhidrato de oxitetraciclina (Equivalente a 300 g de i.a./kg)	30.00
<b>INGREDIENTES INERTES:</b>	
Humectante y diluyente.	60.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>

No. de Registro: RSCO-MEZC-1323-302-002-040

Puede ser nocivo en caso de ingestión  
Puede ser nocivo por el contacto con la piel  
Puede ser nocivo si se inhala



**“HECHO EN MÉXICO”**



Carr. Panamericana Km 284  
2da. Fraccion de Crespo  
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.  
**461 192 0600**

## FICHA TÉCNICA

“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADAS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

CULTIVO	DOSIS	ENFERMEDAD	INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y COSECHA
PAPA	320 g / 400 L de agua	PIERNA NEGRA <i>Erwnia atroseptica</i>	28 días
PERAL	800 g /1000 L de agua	MARCHITEZ BACTERIAL <i>Pseudomonas solanacearum E.F. Smith</i>	21 días

CULTIVO	DOSIS	PLAGA	INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA	OBSERVACIONES
CALABACITA PEPINO MELON CALABAZA SANDIA CHAYOTE CHILACAYOTE	160-320 g/Ha	<b>Mancha angular</b> <i>Pseudomonas syringae pv. lachrymans</i>	SL	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad, volumen de aplicación de 400-500 L de agua/ ha.
JITOMATE BERENJENA CHILE CHILE BELL TOMATE DE CASCARA PAPA	160-320 g/Ha	<b>Mancha Bacteriana</b> <i>Xanthomonas vesicatoria</i>	SL	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad, volumen de aplicación de 550-650 L de agua/ha.
CEBOLLA AJO PORO	160-320 g/Ha	<b>TIZÓN BACTERIANO</b> <i>Xanthomonas campestris pv. Axonopodis</i>	SL	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad, volumen de aplicación de 400-500 L de agua/ha.

SL=Sin Limite

**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:** Después de transcurridas 24 horas de aplicado el producto.

Carr. Panamericana Km 284  
2da. Fraccion de Crespo  
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.  
**461 192 0600**

## › FICHA TÉCNICA

### **MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:**

Abra el envase cuidadosamente por la parte superior y mida la cantidad de producto indicada, mezcle en el tanque aspersor con la mitad de agua recomendada luego agregue la otra mitad del agua agite la mezcla constantemente, para aumentar la penetración del producto agregue un penetrante en la mezcla, aplique con aspersora terrestre (de mochila o de tractor), cubriendo todo el follaje a punto de goteo.

### **CONTRAINDICACIONES:**

No aplicar cuando exista viento fuerte (más de 15 km/hr).

### **INCOMPATIBILIDAD:**

No mezcle CUMBRE WP con Caldo bórdeles y otros productos de fuerte reacción alcalina. Cuando se requiera realizar mezclas estas solo se podrán hacer con productos que tengan registro vigente y estén autorizados en los cultivos aquí indicados.

### **FITOTOXICIDAD:**

**CUMBRE WP** no representa ningún grado de fitotoxicidad a los cultivos recomendados a las dosis indicadas.

### **MANEJO DE RESISTENCIA:**

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.