

› FICHA TÉCNICA

“USO AGRÍCOLA”



COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
METAM SODIO (Uso restringido): N-metilditiocarbamato de sodio (Equivalente a 510 g de i.a./L a 20 °C)	42.00
INGREDIENTES INERTES:	
Diluyente (agua) e impurezas relacionadas.	58.00
TOTAL	100.00

No. de Registro: RSCO-FUMI-0409-319-013-042



Mortal en caso de ingestión
Mortal por el contacto con la piel
Mortal si se inhala

Carr. Panamericana Km 284
 2da. Fraccion de Crespo
 C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

FICHA TÉCNICA

“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

MERCENARIO 42 SL es un fumigante de suelos en presiembra que actúa como fungicida, insecticida y herbicida, recomendado para el control de las siguientes especie:

ESPECIE		DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
ENFERMEDADES Y PLAGAS:		220-300	<p>La aplicación se puede realizar cuando se observe una humedad entre 50 a 80 % de su capacidad de campo y empleando agua para sellar la aplicación.</p> <p>La aplicación se puede realizar utilizando una aspersora de mochila, con boquilla de abanico de gota gruesa</p>
DAMPING OFF	<i>Pythium debaryanum</i>		
GALLINA CIEGA (SL)	<i>Phyllophaga sp.</i>		
MALEZAS:			
VERDOLAGA	<i>Portulaca oleraceae</i>		
ZACATE BERMUDA	<i>Cynodon dactylon</i>		
QUELITE	<i>Amaranthus sp.</i>		
SIEMPRE VIVA	<i>Commelina sp.</i>		
DIENTE DE LEÓN	<i>Taraxacum sp.</i>		
ACEITILLA (SL)	<i>Bidens sp.</i>		

Intervalos entre la última aplicación y la recolección o cosecha del cultivo: SL (Sin Limite). Tiempo de reentrada a las zonas tratadas:48 horas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Para abrir el envase gire la tapa de rosca y retire el sello de seguridad. Mida la cantidad de producto a utilizar con una cubeta graduada. Antes de aplicar **MERCENARIO 42 LS** cultive bien en el área de tratar rompa completamente los terrones y afloje bien el suelo. Una semana antes de la aplicación, humedezca el suelo después del cultivo a la profundidad deseada. Y poco antes aplicar el producto, cultivo ligeramente para romper la costra del suelo. La efectividad de **MERCENARIO 42 SL** se incrementa cuando se sella el suelo después de la aplicación con una cubierta de plástico. Se debe de mantener la cubierta por un mínimo de 48 horas.

Siete días después de la aplicación, se deberá cultivar a 5 cm de profundidad para airear el suelo. No siembre o plante antes de 21 días de haber hecho la aplicación de **MERCENARIO 42 SL**. No se deben mezclar suelos no tratados con suelos ya tratados, para evitar recontaminación.

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

› FICHA TÉCNICA

SUPERFICIES TOTALES

INYECCIÓN AL SUELO: Aplique **MERCENARIO 42 LS** utilizando inyectores de 15 cm.

ASPERSIÓN: Aplique **MERCENARIO 42 LS** utilizando aspersores de gota grande. Para el control de plagas en los primeros 30 cm o menos del suelo, corra el riego 5-10 minutos y en los siguientes 10-20 minutos inyecte al sistema aspersor la cantidad necesaria de **MERCENARIO 42 LS** para el área que cubre el aspersor. En suelos muy ligeros, mantenga la humedad asperjando agua durante 2-3 días. Para el control de plagas a profundidades mayores de 45 cm, divida **MERCENARIO 42 SL** en 3 o más partes iguales y aplique a intervalos durante el periodo de aspersión.

CON RIEGO POR CANAL O DE INUNDACIÓN: Agregue **MERCENARIO 42 SL** al agua de riego dependiendo de la plaga y la profundidad deseada. Use una lámina de 15 – 20 cm de agua/ha.

APLICACIÓN AL SURCO O CAMA (BANDA):

INYECCIÓN: Inyectar **MERCENARIO 42 SL** de acuerdo a las instrucciones anteriores. Si la banda a tratar es mayor, colóquese los inyectores a 15 cm para rodillo de inmediato.

CAMAS: Asperjar **MERCENARIO 42 SL** delante del equipo de formación de la cama, cubra el producto de 8 a 15 cm del suelo y compacte de inmediato la superficie.

CONTRAINDICACIONES

Evite aplicar en la superficie del suelo cuando las temperaturas sean mayores de 30°C. Cuando se utilice cubierta plástica o de papel, no sembrar antes de 21 días.

FITOTOXICIDAD

MERCENARIO 42 LS no es fitotóxico si se utiliza siguiendo las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar **MERCENARIO 42 SL** con fertilizantes con un pH ácido. Cuando se requiera realizar mezclas, estas solo se podrán hacer con productos que tengan registro vigente y estén autorizados en los cultivos aquí indicados.

“MANEJO DE RESISTENCIA”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.



PELIGRO



Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600