

FICHA TÉCNICA

"USO AGRÍCOLA"



COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Spirodiclofen: 2,2-dimetilbutirato de 3-(2,4-diclorofenil)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-il (Equivalente a 240 g/L de i.a. a 20°C).	22.22
INGREDIENTES INERTES:	
Dispersantes / agentes humectantes, antiespumante, anticongelante, espesante, conservador y medio de dispersión.	77.78
Total	100.00

No. de Registro: RSCO-INAC-0103R-X0791-064-22.22

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala



"HECHO EN CHINA"
"ENVASADO EN MÉXICO"



PRECAUCIÓN



Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com

FICHA TÉCNICA

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	OBSERVACIONES	INTERVALO DE SEGURIDAD
Chabacano, Ciruela, Durazno, Nectarina	Ácaro del durazno (<i>Eotetranychus lewisi</i>)	400-500 mL/ha	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 6 días, cuando se detecte la presencia de la plaga; volumen de aplicación sugerido 500 L de agua/ha.	7 días
Manzano, Peral, Tejocote, Membrillo	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	400-600 mL/ha	Realizar una aplicación foliar cuando se corrobore la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación sugerido 600 L de agua/ha.	7 días
Aguacate	Acaro café (<i>Oligonychus punicae</i>)	600-1000 mL/ha	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se corrobore la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación sugerido 800 L de agua/ha.	2 días
Zarzamora, Arándano, Frambuesa, Fresa	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	500-600 mL/ha	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos vivos en el cultivo; volumen de aplicación sugerido 600 L de agua/ha.	7 días
Maíz, Arroz	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	500-600 mL/ha	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos vivos (colonias de ácaros vivos) en el cultivo; volumen de aplicación sugerido 450 L de agua/ha.	0 días
Cidro, Lima, Limón, Mandarina, Naranja, Pomelo, Tangerino, Toronja	Araña roja de los cítricos (<i>Panonychus citri</i>)	750-1000 mL/ha	Realizar una aplicación foliar, cuando se corrobore la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación sugerido 600 L de agua/ha.	7 días
Azalea, Begonia, Clavel, Crisantemo, Dalia, Gardenia, Gerbera, Gladiola, Jacinto, Nochebuena, Rosal, Tulipán	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	400-600 mL/ha	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos sobre las plantas; volumen de aplicación sugerido 200 L de agua/ha.	0 días
Papaya	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	500-750 mL/ha	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se confirme la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación sugerido 500 L de agua/ha.	2 días

() Intervalo de Seguridad: en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 2 horas.

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com

» FICHA TÉCNICA

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: "Durante el manejo y aplicación de este producto, siempre utilice su equipo de protección personal indicado en la sección PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos. Llene el tanque con agua a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. Agregue la cantidad necesaria de **ACARFENS 240 SC** de acuerdo a las dosis indicadas en esta etiqueta, adicione el resto de agua y agite el contenido con ayuda de un utensilio de madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla sea homogénea. Es importante mantener la agitación durante la aplicación".

CONTRAINDICACIONES: No aplicar cuando el cultivo se encuentre bajo estrés. No aplicar con vientos mayores de 8 km/h para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. No mezclar, almacenar ni aplicar este producto en tanques de acero galvanizado, excepto de acero inoxidable. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se utiliza de acuerdo a las dosis y recomendaciones de la etiqueta. Es fitotóxico para todas las plantas verdes y puede dañar a las especies que no son objeto de control, por lo que se debe evitar que la aspersión caiga sobre su cultivo o cultivos aledaños.

INCOMPATIBILIDAD: No se recomienda **ACARFENS 240 SC** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos agroquímicos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

"MANEJO DE RESISTENCIA": "PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".