

FICHA TÉCNICA

“USO AGRÍCOLA”



COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Azoxistrobina: (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato de metilo (Equivalente a 255 g de i.a./L a 20 °C)	24.29
INGREDIENTES INERTES:	
Diluyente, emulsificante, surfactante, dispersante, agente humectante, antiespumante, conservador, estabilizante y espesante	75.71
Total	100.00

No. de Registro: RSCO-FUNG-0386-X0582-064-24.29

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala



“HECHO EN MÉXICO”



Carr. Panamericana Km 284
2da. Fracción de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com

FICHA TÉCNICA

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

FUNGIXTROVIN es un fungicida preventivo y curativo, que actúa de modo sistémico, formulado como suspensión concentrada, utilizado para controlar las enfermedades causadas por los hongos plaga, ver a continuación el cuadro de recomendaciones, donde se muestran los cultivos autorizados para la aplicación de **FUNGIXTROVIN**:

Cultivo	Plaga	Dosis (mL/ha)	Recomendaciones
Berenjena, Chile, Jitomate, Papa, Pimiento Morrón, Tomate verde, Okra (3)	Cenicilla (<i>Leveillula taurica</i>)	300 - 600	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo, volumen de aplicación 530 – 630 L/ha.
() Intervalo de seguridad: Días entre la última aplicación y cosecha.			
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 horas después de la aplicación.			

MÉTODOS DE PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Siempre utilice su equipo de protección personal, indicado en la sección de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras.

Preparación: Abra el envase, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción).

Calibre el equipo de aplicación. Realice el cálculo de la cantidad de producto y de agua de dilución a utilizar. Con ayuda de una probeta, mida la dosis de **FUNGIXTROVIN** recomendada para la plaga a controlar. Añada la mitad del volumen total de agua a utilizar. Agregue la totalidad de la cantidad de producto a emplear, vacíe el resto del agua de dilución. Cierre perfectamente el tanque. Agite hasta obtener una mezcla perfectamente homogénea.

Aplicación: Realice la aplicación directa al follaje, asegúrese de cubrir perfectamente las áreas que desea tratar. Ponga especial atención en la técnica de aspersión, a fin de conseguir un tratamiento óptimo.

CONTRAINDICACIONES: Aplique temprano por la mañana, o por la tarde, cuando no se presenten temperaturas elevadas. No aplique si existe alta probabilidad de lluvia próxima, a fin de evitar la pérdida del producto por lavado. No aplicar si la velocidad del viento es alta (más de 10 km/h).

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico, siempre y cuando siga las recomendaciones indicadas.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar **FUNGIXTROVIN** con otros productos agroquímicos. Sin embargo, si se desea mezclar se recomienda que la mezcla se realice con los productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad previas a la aplicación.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fracción de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com